Tri optique infrarouge grain à grain comme outil de phénotypage haut débit technologique et sanitaire

Pierre-Yves Werrie, Corentin Demoitie, Guillaume Jacquemin, Bruno Godin et les équipes de sélection et du laboratoire de technologie

VALorisation des CERéales WALLonnes (VALCERWAL)

- Meilleure valorisation des céréales wallonnes (alimentation humaine)
 - Qualité technologique et sanitaire adaptée à la transformation
 - Culture moins intensive (demande sociétale)
- Augmenter la valeur ajoutée
 - Meilleur revenu filière
- Augmenter les usages possibles
 - Meilleure résilience

- 3 partenaires CRA-W
- U11- Labo chromato
- U11- Labo techno
- U12
- SOCOPRO
- CEPICOP

Soutenir la **recherche appliquée** et
l'**innovation technologique**

Meilleure valorisation des céréales wallonnes

3) Optimiser les outils de tri à la valorisation recherchée

- Trieurs et réglage en fonction des problématiques et de la qualité envisagée
→ Plateforme de pilotes de tri de laboratoire

Répartition des déchets éliminés en production de semences

80' - NIR pour un seul
grain (dureté, protéines)
Qualité et sélectionneurs

90' - NIR grain
individuel et tri
(automate)

Présent- application
industrielle (T/h)

70' – NIR dans
le champs des
céréales

Principe de fonctionnement :

- Singularisation/Séparation des grains
- Détection (transmittance ou réflectance dans le proche infrarouge)
- Ejection (air comprimé)

Prache et al., 2022

Qualité technologique = Aptitude à la transformation

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

Aptitude à la transformation en lien avec des caractéristiques :

- **Physiques**
PMG, PS, Dureté, Humidité,...
- **Physico-chimiques**
Protéine, Amidon, Enzyme
- **Rhéo-fermentaires**
Rhéologique, Fermentaire

Classe de qualité (valeur commerciale)

Relative selon zone géographique et usage

Classes	Protéines en % de matière sèche	W en 10 ⁻⁴ joules/g	PS en kg/hl	Hagberg en seconde
Premium (A1)	> 11.5	> 170	> 77	> 240
Supérieur (A2)	> 11	Non spécifié	> 76	(> 220)
Medium (A3)	> 10.5	Non spécifié	Non spécifié	(> 170)
Access (A4)	Spécifique au contrat	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié

Caractéristiques technologiques étudiées

	Gluten	Amidon	Alpha-amylase
Méthodes d'analyses	- Poids à l'hectolitre (Poids spécifique)		
	- Humidité par infrarouge ou conductivité		
	- Protéines et Amidon par infrarouge		
	- SDS/Redman <i>Estimation force du gluten</i>	- Hagberg (ou Stirring Number) <i>Sans inhibition enzymatique</i>	
	- Glutomatic <i>Force et estimation nature du gluten</i>	- Viscosimètre RVA et MCR <i>Sans ou Avec inhibition enzymatique Propriétés rhéologiques à chaud et à froid</i>	
	- Mixolab Chopin + <i>Stabilité gluten, absorption d'eau et propriétés rhéologiques à chaud et à froid</i>		
	- Zélény et sa mouture rapide <i>Estimation force du gluten</i>		
	- Alvéographe Chopin <i>Force et nature du gluten</i>		

Qualité panifiable belge du froment	Améliorant	Premium	Supérieur
Variété	Q1A	Q1	Q2
Humidité (%)	≤ 14,5 (≤ 15,5)		
Hagberg(s)	≥ 220 (≥ 180)		
Alvéographe Chopin : W Force boulangère (10-4 J)	≥ 275 (≥ 250)	≥ 225 (≥ 200)	≥ 175 (≥ 150)
Alvéographe Chopin : P/L Rapport Ténacité/Extensibilité	≤ 1,5 (≤ 2,0)		
Stabilité du gluten au Mixolab + (min)	≥ 10	≥ 9	≥ 8
Zélény (ml)	≥ 40	≥ 35	≥ 30
Protéines (N*5,7 ; %MS)	≥ 12,0 (≥ 11,5) BIO : ≥ 11,5 (≥ 11,0)	≥ 11,5 (≥ 11,0) BIO : ≥ 11,0 (≥ 10,5)	≥ 11,0 (≥ 10,5) BIO : ≥ 10,5 (≥ 10,0)
Poids à l'hectolitre brut (kg/hl)	≥ 76,0 (≥ 73,0)		

Les valeurs entre parenthèses correspondent au seuil limite souple.

Projet FARWAL Vade Mecum sur la création d'une filière céréalière complète

➔ **Classement des variétés et des itinéraires de production**

Trieur Optique

Qsorter Explorer
Qualysense ©

20-30 ms/graine

1. Acquisition : Spectre IR par réflexion 900-1700nm et image RGB
2. Prédiction (machine learning)
3. Tri (seuil de coupure fixe ou variable)

Machine learning :

Développement et implémentation de modèles **PLS-DA** et **PLS-R** :

Valeur(s) de référence(s)

Spectre grain

Spectres moyen (+/- 1500)

Spectre

Pré-traitement :

- SNV
- Savitzky-Golay

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

Applications potentielles dans

1) Automatisation du
Contrôle qualité

2) Amélioration de la
qualité des lots

3) Appuis à la création variétal

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

1) Automatisation du Contrôle qualité (Détection des contaminants)

Qualité sanitaire : ergot (*Claviceps purpurea*)

directive européenne 1399/2021, la présence de sclérotés dans les lots de céréales destinées aux denrées alimentaires ne doit pas dépasser 0.2 g/kg (3 à 5 sclérotés)

Méthodes « des contrôles officiels »
règlements EU 401/2006 et 691/2013

60 à 100 **échantillons élémentaires** (1kg) dans une benne de 30 tonnes

1) Automatisation du Contrôle qualité (Détection des contaminants)

Qualité sanitaire : Grains fusariés

1) Automatisation du Contrôle qualité

Qualité technologique : Teneur en protéine Froment

Distribution (homogénéité du lot)
potentiel de tri

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

2) Amélioration de la qualité des lots

Qualité technologique : Teneur en protéine Froment

Variety	Country	Year	High molecular weight glutenin (HMWG)			Grades
			Glu-A1	Glu-B1	Glu-C1	
Alessio	Autriche	2016	1	7+9	2+12	Standard
Arminius	Autriche	2016	2*	7+9	5+10	Breadmaking
Christoph	Autriche	2018	1	7+9	5+10	Breadmaking
Kerubino	Luxembourg	2010	0	7+9	2+12	Breadmaking
Cubitus	France	2019	0	6+8	5+10	Standard
Socade CS	Belgium/France	2020	2*	7+8	5+10	Standard
Broadway	Belgium	2020	0	6+8	5+10	Standard
LG Keramik	PL BE CZ	2019	0	17+18	5+10	Standard
LG Optimist	Belgium	2022	1	7+8	3+12	Standard
LID Calinda	Belgium	2024	2*	6+8	5+10	Breadmaking
Moschus	Germany	2016	2*	17+18	2+12	Breadmaking

Technological quality
Evaluation on

Grain

Dough

Bread
characteristics

- Grain protein content
- Hagberg Falling number
- Zeleny sedimentation index
- Flour milling and quality (Milling, Flour, Glutomatic)
- Dough rheological quality (Glutopack, Alveolab, Mixolab)
- Bread morphology
- Texture profile analysis
- Crumb structure

EXEMPLE D'UTILISATION EN MEUNERIE

2) Amélioration de la qualité des lots

Qualité technologique : Teneur en protéine Froment

Mean predicted protein content distribution

Histogram and theoretical densities

Histogram and theoretical densities

2) Amélioration de la qualité des lots

Qualité technologique : Teneur en protéine Froment

Évaluation robustesse technologique

2) Amélioration de la qualité des lots

Qualité technologique : Teneur en protéine Froment

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

3) Appuis à la création variétal

Qualité technologique : Teneur en protéine & mitadinnage Blé dur (C. Demoitié)

La sélection : une activité pluridisciplinaire

Blé dur de qualité (protéine/mitadinnage) adapté au climat belge (futur)
Sélection Phénomique

3) Appuis à la création variétal

Qualité technologique : Teneur en protéine & mitadinnage Blé dur (C. Demoitié)

Diminution mitadinnage fraction vitreuse en-dessous norme industrie même pour lot très mitadins

3) Appuis à la création variétal

Qualité technologique : Teneur en protéine & mitadinnage Blé dur (C. Demoitié)

Chaque point est une répétition d'un croisement de blé dur en F3
Ecart important entre les croisement et au sein des répétition de ceux-ci

3) Appuis à la création variétal

Teneur en protéine moyenne après tri des 20% supérieur

mean protein of durum cross after SK-NIR sorting (20%)

Kruskal-Wallis, $p = 1.4e-11$

3) Appuis à la création variétal

Tendance similaire pour la
vitrosité des grains

3) Appuis à la création variétal

Relation Vitrosité vs Protéines selon chaque croisement

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

3) Appuis à la création variétal

Croisement incluant
Wintergold

Croisement incluant
Karur

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

3) Appuis à la création variétal

Classement rapide et bon marché de la descendance

- La pépinière F4 est sur 6 rangs
- 2 rangs avec des grains à haute teneur en protéines

- Les spectres NIR en tant qu'indicateur du caractère cible
- Possibilité d'étendre à d'autres environnement (GEI)
- Inclure des données génomiques

Sélection Phénomique

Fig. 1 Prediction of a target trait for the selection candidates in different environments with GLOB selection. Training population is phenotyped for the target traits (e.g., productivity) in the target environments. Omics or phenomic data (e.g., NIR spectra) are collected on both the candidates and the training individuals in a same reference environment, for capturing a genetic similarity between individuals. Genotypic values of the selection candidates are predicted for the target traits in each target environment

Technologique

- Temps de chute de hagberg (pré-germination physiologique)
- Qualité des protéines (zélény, W,...)

Qualité sanitaire

- Grains fusariés (mycotoxines)
- Carie

Sélection variétale

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

Envoyez nous vos échantillons !

Des questions / collaborations ?
p.werrie@cra.wallonie.be

Merci pour votre attention !

NIR grain
individuel & tri

Phénotypage
«technologique»

Plateforme de
spectroscopie

Application
céréales

Perspective &
conclusion

Envoyez nous vos échantillons !

Des questions / collaborations ?
p.werrie@cra.wallonie.be

Merci pour votre attention !

II. VALorisation des CERéales WALLonnes (VALCERWAL)

- Meilleure valorisation des céréales wallonnes (alimentation humaine)
 - Qualité technologique et sanitaire adaptée à la transformation
 - Culture moins intensive (demande sociétale)
- Augmenter la valeur ajoutée
 - Meilleur revenu filière
- Augmenter les usages possibles
 - Meilleure résilience

- 3 partenaires CRA-W
- U11- Labo chromato
- U11- Labo techno
- U12
- SOCOPRO
- CEPICOP

Soutenir la **recherche appliquée** et
l'**innovation technologique**

Meilleure valorisation des céréales wallonnes

3) Optimiser les outils de tri à la valorisation recherchée

- Trieurs et réglage en fonction des problématiques et de la qualité envisagée
→ Plateforme de pilotes de tri de laboratoire

Répartition des déchets éliminés en production de semences